



ที่ อค ๗๔๘๐๑/๓๓/๘

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม
เลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๑๐ หนองเม็ก - ไชยวาน
อค ๔ ๑ ๒ ๙ ๐

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารเกี่ยวกับความรู้ และแนวทางป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน ๒ ชุด

ด้วย สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก เกิดการระบาดในช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม-สิงหาคม) ซึ่งในแต่ละปีจะพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจำนวนมาก และโรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่มีอยู่กลายเป็นพาหะนำโรค ยุงลายจะอาศัยอยู่ในบ้านและบริเวณรอบๆบ้าน มักกัดคนในเวลากลางวัน โดยอาการของโรค จะมีไข้สูงลอย ประมาณ 2-7 วัน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ส่วนใหญ่มีอาการหน้าแดง อาจมีจุดเล็กๆตามลำตัว แขน ขา มักมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายดำ และเบื่ออาหาร ในส่วนของการดูแลตัวเองเบื้องต้น ๑. ควรรับผู้ป่วยไปพบแพทย์ทันที ๒. ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวลดไข้ ๓. ใช้น้ำลายใช้พาราเซตามอล ห้ามใช้ยาแอสไพริน เพราะอาจทำให้เลือดออกได้ง่าย ๔. ให้ดื่มน้ำผลไม้ หรือน้ำตาลเกลือแร่บ่อยๆ ๕. ระวังอย่าให้ยุงกัดในเวลากลางวัน ให้นอนกางมุ้ง หรือทายากันยุง ๖. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธให้ประชาชนในเขตพื้นที่ทราบเกี่ยวกับการช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่มีน้ำขังทุกสัปดาห์ เพื่อตัดวงจรการเกิดยุงลาย ซึ่งก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก โดยการรณรงค์ให้กับประชาชนมีพฤติกรรม การเก็บ 3 เก็บ คือ เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย และ 5ป. 1ข. ปราบยุงลาย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกมล พิณจมนตรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

สำนักปลัด

โทร./โทรสาร ๐๔๒-๒๑๙๒๑๓

ปราบยุงลายให้สิ้นซาก ไม่ยุ่งยากด้วย **คาถา 5 ป.**



โรคไข้เลือดออก เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี ซึ่งมีอยู่ 4 ชนิด เป็นแล้ว เป็นได้อีก



กำจัดลูกน้ำ ยุงลาย และแหล่งเพาะพันธุ์
ทำได้ด้วยมือคุณ



เริ่มต้นที่
บ้านคุณเอง

1 ปิด

ปิดฝาภาชนะใส่
น้ำให้มิดชิด



2 ปัก

ปัก
ปล่อยปลาในลูกน้ำ



3 เปิด

เปลี่ยนน้ำทุก 7 วัน



5 ปฏิบัติ

ปฏิบัติ
เป็นประจำ



4 ปรับ

ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม



สายด่วน
กระทรวงสาธารณสุข
1422

ไข้เลือดออก

อาการ

1. ไข้สูงลอย

39 - 40 องศา ประมาณ 2-5 วัน

2. อาการเลือดออก

เลือดกำเดาไหล อาเจียน ถ่ายดำ มีจุดเลือดออกตามตัว เลือดออกตามไรฟัน

3. อาการตับโต

กดเจ็บบริเวณชายโครงขวา

4. ภาวะช็อก

เกิดช่วงไข้ลด ปวดท้องมาก กระสับกระส่าย ซึม อาเจียนหรือ ถ่ายเป็นเลือด มือเท้าเย็น ชีพจรเบาและเร็ว ความดันต่ำ



การรักษา



เช็ดตัวลดไข้เป็นระยะ



กินยาลดไข้ชนิดพาราเซตามอล

ห้าม ใช้ยาแอสไพรินเด็ดขาด



ดื่มน้ำ หรือน้ำเกลือแร่บ่อยๆ




หากมีไข้เกิน 3 วัน หรือมีอาการช็อก

ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที



เกิดจากไวรัสเดงกี โดยมียุงลายบ้านเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ
ระยะฟักตัวในยุงประมาณ 8-12 วัน เมื่อยุงลายไปกัดคนอื่น
ก็จะปล่อยเชื้อไปยังผู้ที่ถูกกัด โดยระยะฟักตัวในคนประมาณ 5 - 8 วัน
(สั้นที่สุด 3 วัน - นานที่สุด 15 วัน)
ก็จะทำให้เกิดอาการของโรคได้



3 เก็บ ป้องกันได้

1. เก็บน้ำ

เก็บน้ำให้มิดชิด ปิดฝาภาชนะ
ภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้ให้ปล่อยน้ำทิ้ง
หรือเปลี่ยนน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์
หรือปล่อยปลาทองกินลูกน้ำ

2. เก็บขยะ

เก็บขยะและเศษภาชนะ
ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

3. เก็บบ้าน

เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้
ยุงลายอยู่อาศัย



ประชาสัมพันธ์กรุงเทพ @pr_bangkok



สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. @prbangkok

ขอบคุณข้อมูลจาก

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

และศูนย์ไข้เลือดออก กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร